

Mögliche Ursachen von Zahnschmerzen oder Problemen mit Zähnen bzw. im Mundraum

Sie haben Probleme mit Ihren Zähnen? Nachfolgend haben wir einige Informationen über mögliche Ursachen für Sie zusammengefasst. Natürlich kann dies eine zahnmedizinische Untersuchung nicht ersetzen. Wenn Sie Probleme mit Ihren Zähnen haben, empfehlen wir in jedem Fall den Besuch beim Zahnarzt. Machen Sie am besten gleich einen Termin in unserer Praxis aus: +49-2421-38224

Der Zahn tut weh, weil ... er ein Loch hat und auf heiß und kalt überreagiert; beim Klopfen auf den Zahn tut dieser nicht weh.

Solange der Zahn auf heiß und kalt reagiert bedeutet das, dass er lebt. Dies wiederum heißt, dass es ihm verhältnismäßig gut geht. Man kann den Zahn mit einem provisorischen Füllungsmaterial verschließen, welches es in der Apotheke zu kaufen gibt.

Der Zahn tut weh, weil ... er ein Loch hat und beim Zubeißen sehr weh tut, er reagiert aber nicht auf heiß und kalt, und die Backe ist nicht geschwollen. Beim Klopfen tut er sehr weh.

Der Zahnnerv ist voraussichtlich abgestorben. An der Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die Schmerzen im Knochen und um den Zahn herum verursacht. Man sollte zum Zahnarzt gehen (auch im Urlaub). Die Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses Loch können Eiter und Gase entweichen. Das ist hier leider die einzige Chance. Manchmal kann ein Antibiotikum helfen.

Der Zahn tut weh, weil ... er ein Loch hat, nicht auf heiß und kalt reagiert, beim Zubeißen sehr weh tut, und die Backe dick ist. Beim Klopfen tut er sehr weh.

Der Zahnnerv ist fast sicher abgestorben. Um die Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die Schmerzen im Knochen und um den Zahn herum verursacht. Zusätzlich ist viel Eiter entstanden, welches schon ins Weichgewebe ausströmt. Man muss unbedingt zum Zahnarzt gehen (auch im Urlaub). Die Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses Loch können Eiter, und gefährliche Gase entweichen. Zusätzlich kann es sein, dass ein kleines Loch in die Wange geschnitten werden muss, um dem vielen Eiter eine Abflussmöglichkeit zu geben. Das ist hier leider die einzige Chance.

DER ZAHNARZTBESUCH MUSS SOFORT ERFOLGEN. DIESE FORM DER ERKRANKUNG KANN GEFÄHRLICHE DIMENSIONEN ANNEHMEN.

Ein Antibiotikum kann zusätzlich verschrieben werden. Das "Im Zahn Loch machen" tut nicht weh, weil der Zahn ja tot ist. Für das Anschneiden des Weichgewebes ist dagegen eine Spritze nötig.

Der Zahn tut weh, weil ... der Zahnarzt nach einer noch nicht abgeschlossenen Wurzelkanalbehandlung ein Medikament in den Zahn eingebracht und das Loch im Anschluss mit einer provisorischen Füllung versorgt hat.

Schmerzen entstehen durch Druck im Zahn.

Behandlung: Zahn belüften. Man kann versuchen diese in der Regel sehr spröde Füllung rauszunehmen, z.B. mit einer Nagelschere. Klappt es nicht, ist man gezwungen den Zahnarzt aufzusuchen, weil es sonst noch viel schlimmer werden kann

Die Wunde tut nach Zahn Ziehen weh ... noch 2 Stunden danach.

liegt noch im Normbereich.

Die Wunde tut nach Zahn Ziehen weh ... noch 4 Stunden danach.

Schmerztabletten einnehmen, Mundspülung (bis 2 Stunden nach der Extraktion bitte keine Mundspülung). Am nächsten Tag den Zahnarzt aufsuchen.



Die Wunde tut nach Zahn Ziehen weh ... noch am nächsten Tag.

Voraussichtlich hat sich die Wunde entzündet. Zahnarztbesuch unausweichlich. Die Wunde muss gespült oder aufgefrischt, oder mit einem Medikament versorgt werden, oder alles auf einmal.

Zahn ist gelockert weil ... es ein lockerer Milchzahn ist.

Ist unter Umständen normal.

Zahn ist gelockert weil ... es ein lockerer bleibender Zahn ist.

Voraussichtlich leiden Sie unter Parodontose. Gehen Sie bei nächster Gelegenheit zum Zahnarzt, um eine Zahnfleischbehandlung durchzuführen.

Zahn ist gelockert weil ... ich einen Unfall hatte.

Zahn soweit es geht vorsichtig in die Normallage zurückstellen. Sofort zum Zahnarzt. Zahn darf nicht aus der Wunde entfernt werden. Es sei denn: Patient ist (fast) bewusstlos, und könnte den lockeren Zahn einatmen oder verschlucken.

Zahn ist raus gefallen weil ich ... einen Unfall hatte.

Zahn im eigenen Mund oder in Milch aufbewahren, und sofort zum Zahnarzt. Ggf. kann so der Zahn gerettet werden!

Zahn ist raus gefallen weil ich ... er seit längerem schon sehr locker war.

Voraussichtlich leiden Sie unter Parodontose. Gehen Sie bei nächster Gelegenheit zum Zahnarzt, um eine Zahnfleischbehandlung durchzuführen.

Zahnfüllung ist raus gefallen ... der Zahn tut dabei permanent weh und reagiert nicht auf heiß und kalt. Beim Klopfen schmerzt er.

Der Zahnnerv ist voraussichtlich abgestorben. Um die Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die Schmerzen im Knochen um den Zahn herum verursacht. Man sollte zum Zahnarzt gehen (auch im Urlaub). Die Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses Loch können Eiter, und gefährliche Gase entweichen. Das ist hier leider die einzige Chance. Manchmal kann ein Antibiotikum helfen, aber Vorsicht ! Das "Im Zahn Loch machen" tut nicht weh, weil der Zahn ja tot ist. Man braucht auch keine Spritze.

Zahnfüllung ist raus gefallen ... der Zahn tut dabei nicht weh, und reagiert auf heiß und kalt. Beim Klopfen schmerzt er nicht.

Solange der Zahn auf heiß und kalt reagiert bedeutet das, dass er lebt. Dies wiederum heißt, dass es ihm verhältnismäßig gut geht. Man kann den Zahn mit einem provisorischen Füllungsmaterial verschließen, welches es in der Apotheke zu kaufen gibt. Sobald möglich, den Zahnarzt aufsuchen!

Die Wange ist dick ... tut aber nicht weh.

Der Zahnnerv ist voraussichtlich abgestorben. Um die Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die Schmerzen im Knochen um den Zahn herum verursacht. Zusätzlich ist viel Eiter entstanden, welches schon ins Weichgewebe ausströmt. Man muss unbedingt zum Zahnarzt gehen (auch im Urlaub). Die Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses Loch können Eiter, und gefährliche Gase entweichen. Zusätzlich kann es sein, dass ein kleines Loch in die Wange geschnitten werden muss, um dem vielen Eiter eine Abflussmöglichkeit zu geben. Das ist hier leider die einzige Chance.

DER ZAHNARZTBESUCH MUSS SOFORT ERFOLGEN. DIESE FORM DER ERKRANKUNG KANN GEFÄHRLICHE DIMENSIONEN ANNEHMEN.

Ein Antibiotikum kann hier zusätzlich verschrieben werden. Das "Im Zahn Loch machen" tut nicht weh, weil der Zahn ja tot ist. Für das Anschneiden des Weichgewebes ist eine Spritze nötig.

Die Wange ist dick ... und tut weh, zusätzlich habe ich eventuell noch Fieber.

Der Zahnnerv ist voraussichtlich abgestorben. Um die Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die Schmerzen im Knochen um den Zahn herum verursacht. Zusätzlich ist viel Eiter entstanden, welches schon ins Weichgewebe ausströmt. Man muss unbedingt zum Zahnarzt gehen (auch im Urlaub). Die Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses Loch können Eiter, und gefährliche Gase entweichen. Zusätzlich kann es sein, dass ein kleines Loch in die Wange geschnitten werden muss, um dem vielen Eiter eine Abflussmöglichkeit zu geben. Das ist hier leider die einzige Chance.

DER ZAHNARZTBESUCH MUSS SOFORT ERFOLGEN. DIESE FORM DER ERKRANKUNG KANN GEFÄHRLICHE DIMENSIONEN ANNEHMEN.

Ein Antibiotikum kann hier zusätzlich verschrieben werden.

Das Zahnfleisch tut weh weil ... ich eine Druckstelle habe.

In der Apotheke gibt es eine Vielzahl von Salben, oder speziellen Stoffeinlagen, die man auf die betreffende Stelle tun kann. Wenn es sehr schlimm ist, Prothese über Nacht weg lassen. Zum Zahnarzt gehen, damit er die Kunststoffüberschüsse entfernen kann.

Das Zahnfleisch tut weh weil ... ich (mein Kind)eine Aphte (weißer Fleck auf dem Zahnfleisch) habe.

Mundspülung mit Mundspüllösungen aus der Apotheke. Beim Zahnarzt gibt es eine Salbe dagegen.

Das Zahnfleisch tut weh weil ... ich mich verbrannt habe.

Eventuell eine schmerzlindernde Salbe auftragen. Bei größeren Verbrennungen sofort kalt spülen und danach zum Arzt gehen.

Das Zahnfleisch tut weh weil ... mir etwas ins Zahnfleisch gekommen ist (Popcornschale u. ä.).

Falls man es nicht selbst entfernen kann, am nächsten Tag zum Zahnarzt.

Prothese ist ... durchgebrochen.

Oft kann die Prothese provisorisch mit Sekundenkleber repariert werden. Vorsicht bei Teleskopen. Nach dem Kleben immer 5 Minuten abwarten, und danach die Prothese für weitere 2 Minuten ins kalte Wasser legen.

Provisorium ist ... raus gefallen.

Provisorium vorsichtig wieder rein tun. Wenn es weg ist, einfach am nächsten Tag zum Zahnarzt gehen. Ein neues Provisorium muss zum Zahnschutz angefertigt werden.

Alle / Viele Zähne sind ... überempfindlich auf heiß und kalt.

Die Zähne sollten regelmäßig fluoridiert werden. Fluorid Lack / Gelee aus der Apotheke, wenig saure Getränke trinken.